

新型コロナウイルスワクチン 予防接種を受ける前にご確認ください ～ワクチンおよび副反応のご説明～



新型コロナウイルス感染症と ワクチンについて

新型コロナウイルスは感染しやすく、特に高齢の方は重い症状になりやすいことがわかっています。

また、ワクチンを受けることで、入院や重症になるリスクを減らすことができます。

現在、新型コロナウイルスにはいくつかの種類があり、国で安全性が確認されたものが使われています。どのワクチンを使っているかは、医療機関によって違いがあります。

「このワクチンを打ちたい」という希望がある場合は、予約する前に医療機関にご確認ください。

ワクチンの副反応について

下の表にあるように、接種したワクチンによって、副反応（体調の変化）が出ることがあります。予防接種は、本人の希望で受けるものです。

ワクチンの効果や副反応について、よく理解したうえで、接種するかどうかを決めてください。

メーカー名	ファイザー社	モデルナ社	第一三共社	Meiji Seika ファルマ社	武田薬品社	
ワクチンの種類	mRNAワクチン			mRNAワクチン (レプリコンワクチン)	組み換えタンパクワクチン	
発現割合※3	50%以上	痛み※1、疲労、頭痛	痛み※1、疲労、頭痛	痛み※1、倦怠感	痛み※1	痛み※1、疲労 筋肉痛、頭痛
	10%～49%	筋肉痛、悪寒 関節痛、発熱、下痢 腫れ※1	筋肉痛、悪寒、 関節痛、吐き気、嘔吐 リンパ節の腫れや痛み 発熱、腫れ※1 しこり※1、赤み※1	熱感※1、腫れ※1 赤み※1、かゆみ※1 しこり※1、頭痛、発熱 筋肉痛	倦怠感、頭痛、悪寒 筋肉痛、関節痛、発熱 めまい、腫れ※1 しこり※1、赤み※1	倦怠感、関節痛 吐き気、嘔吐
	1～9%	赤み※1、嘔吐、疼痛 リンパ節の腫れや痛み	痛み※2、腫れ※2 赤み等※2	赤み※2、腫れ※2 かゆみ※2、熱感※2 しこり※2、痛み※2 リンパ節の腫れや痛み 発疹、腋の痛み	かゆみ※1、下痢 吐き気、嘔吐	腫れ※1、しこり※1 赤み※1、発熱、四肢痛
◆ごく稀に生じる重大な副反応で、出やすいとされる症状	ショック、アナフィラキシー、心筋炎、心膜炎				ショック アナフィラキシー	

※1 ワクチンを接種した部位の症状

※2 接種後7日以降のワクチンを接種した部位の症状

※3 ワクチンを接種して副反応を生じた場合、どの症状がどれくらい出やすいかを示す割合



▽ワクチンについて詳しくはこちら（厚労省ホームページ）

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_qa.html

